
# STRELITZIA JOC BAUER QUEENS ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000058885**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000058885**<br>NUMER | **2018-05-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **851** | 0.50 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **346** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1037** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1009** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1150** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1136** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1739** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **929** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **36** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **33.6** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **43** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **35** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.33 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.51 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 35 | 28 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 35 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 35 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.78 | 35 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.58 | 35 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.54 | 35 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 35 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **128** | wąski | | szeroki | 0.73 | 35 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 35 | 28 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.36 | 35 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 35 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.58 | 35 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **127** | niskie | | wysokie | 0.60 | 35 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | | mocne | 0.47 | 35 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.76 | 35 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 35 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.78 | 35 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 35 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 35 | 28 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.62 | 35 | 28 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.26 | 35 | 28 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.17 | 35 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.25 | 86 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.24 | 60 | 25 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.23 | 102 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.41 | 81 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |