
# WHG ALLSEED WINDROW ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000058972**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000058972**<br>NUMER | **2018-08-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **874** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **258** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1196** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1115** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1118** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1067** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1895** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **510** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.9** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **25.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **34** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | 30 | 24 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | 30 | 24 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | | | pożądana | 0.55 | 30 | 24 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | | | wysoki | 0.76 | 30 | 24 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | | | głęboki | 0.58 | 30 | 24 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.55 | 30 | 24 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.72 | 30 | 24 |
| szerokość zadu | MACE | **123** | wąski | | | > | szeroki | 0.71 | 30 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | | | podsiebna | 0.61 | 30 | 24 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.38 | 30 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | | | równolegle | 0.45 | 30 | 24 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | | | mocne | 0.57 | 30 | 24 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **119** | niskie | | | | wysokie | 0.60 | 30 | 24 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | | | mocne | 0.49 | 30 | 24 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | | | wysokie | 0.75 | 30 | 24 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | | | wąskie | 0.70 | 30 | 24 |
| długość strzyków | MACE | **67** | krótkie | < | | | długie | 0.76 | 30 | 24 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **116** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.70 | 30 | 24 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 30 | 24 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | | | mocna | 0.61 | 30 | 24 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.35 | 30 | 24 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.28 | 30 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.33 | 96 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.31 | 73 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **79** | < | | | 0.32 | 110 | 72 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.43 | 92 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |