
# NLBC SCOGAN ERLANGER ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001572874808**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001572874808**<br>NUMER | **2020-12-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **845** | 0.40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **291** | 0.59 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1105** | 0.35 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1007** | 0.20 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1151** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.31 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1949** | 0.51 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1067** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **31.1** | 0.60 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **27.7** | 0.58 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **25** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **22** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.15 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.19 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.24 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.45 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.35 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.31 | 20 | 17 |
| wymię | MACE | **123** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 20 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.46 | 20 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.71 | 20 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.50 | 20 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.47 | 20 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 20 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.65 | 20 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 20 | 17 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.27 | 20 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.34 | 20 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.48 | 20 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **129** | niskie | | wysokie | 0.51 | 20 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.40 | 20 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.69 | 20 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 20 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.69 | 20 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 20 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.40 | 20 | 17 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.53 | 20 | 17 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.18 | 20 | 17 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.12 | 20 | 17 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.16 | 68 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **110** | | | | 0.13 | 25 | 16 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.14 | 76 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.21 | 27 | 17 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |