
| ASHAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000126978683**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609313749**<br>NUMER | **1995-01-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-40** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **889** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1019** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **941** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **991** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1017** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-446** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.8** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.9** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-30.5** | 0.39 |
| % LAKTOZY | **-0.11** | 0.39 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | - | - |
| budowa ogólna | I | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.72 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **77** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **105** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **109** | wąska | | szeroka | 0.80 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | I | **95** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **90** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **84** | luźne | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **94** | niskie | | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **98** | słabe | | mocne | 0.71 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **79** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **108** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | I | **74** | ordynarny | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | I | **121** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | I | **84** | słaba | | dobra | 0.49 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | 0.34 | 65 | 62 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.17 | 64 | 61 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **97** | | | | 0.46 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **99** | | | | 0.40 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **102** | | | | 0.40 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 101 | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |