
# NIBBELINK LORD ELLIOT
NAZWA

| NLDM000205675212 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL205675212** | **1997-03-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **624** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **989** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **894** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **930** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-640** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-632** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.7** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 47 | 43 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 47 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 47 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.83 | 47 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **78** | płytki | | głęboki | 0.67 | 47 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.69 | 47 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 47 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.75 | 47 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 47 | 43 |
| racice | MACE | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 47 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 47 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.72 | 47 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.68 | 47 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.62 | 47 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.80 | 47 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 47 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.83 | 47 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 47 | 43 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.69 | 47 | 43 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.42 | 34 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **84** | | | | 0.42 | 36 | 34 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.31 | 34 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.50 | 168 | 100 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.45 | 18 | 17 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.43 | 280 | 165 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.58 | 68 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |