
| TWISTER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000227280122** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL000609364348** NUMER | **1998-03-02** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-96** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **796** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1013** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **846** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **979** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1364** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-698** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.3** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.4** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-27.2** | 0.39 |
| % LAKTOZY | **0.08** | 0.39 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| budowa ogólna | I | **69** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **87** | niski | | wysoki | 0.81 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **108** | płytki | | głęboki | 0.65 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **108** | wąska | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | szeroki | 0.72 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **90** | iksowate | | równolegle | 0.53 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **79** | luźne | | mocne | 0.71 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **69** | niskie | | wysokie | 0.66 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **88** | słabe | | mocne | 0.61 | - | - |
| położenie wymienia | I | **77** | niskie | | wysokie | 0.78 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **71** | szerokie | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **106** | krótkie | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **76** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **114** | słaba | | mocna | 0.75 | - | - |
| lokomocja | I | **81** | słaba | | dobra | 0.47 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.36 | 32 | 26 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.25 | 32 | 27 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **97** | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **86** | | | | 0.41 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **101** | | | | 0.40 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 93 | | | | 0.56 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |