
# APINA SANDER
NAZWA

| NLDM000240688279 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL240688279** | **1999-10-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **722** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **120** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **990** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **990** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **920** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **297** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-9** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.5** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.7** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-1.6** | 0.25 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.25 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **84** | niski | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **89** | płytki | | głęboki | 0.69 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | szeroka | 0.74 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | - | - |
| racice | I | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **85** | iksowate | | równolegle | 0.56 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **103** | luźne | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **81** | niskie | | wysokie | 0.70 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **82** | słabe | | mocne | 0.63 | - | - |
| położenie wymienia | I | **93** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **83** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **96** | krótkie | | długie | 0.90 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **111** | słaba | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | I | **83** | słaba | | dobra | 0.45 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.32 | 76 | 70 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.16 | 72 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **100** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **99** | | | | 0.38 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **108** | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 100 | | | | 0.58 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |