
# ETAZON MICK
NAZWA

| NLDM000261458530 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL261458530** | **1999-06-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-148** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **934** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **999** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **982** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **954** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-569** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-202** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.2** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.2** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-6.6** | 0.40 |
| % LAKTOZY | **0.04** | 0.40 |
| LICZBA CÓREK | **3** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | - | - |
| wymię | I | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | - | - |
| budowa ogólna | I | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **80** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **75** | płytki | | głęboki | 0.71 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **69** | wąska | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | I | **90** | wąski | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **98** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **106** | luźne | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **100** | niskie | | wysokie | 0.72 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **119** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **102** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **123** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **79** | krótkie | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **128** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **93** | słaba | | mocna | 0.81 | - | - |
| lokomocja | I | **97** | słaba | | dobra | 0.54 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.38 | 79 | 72 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.22 | 80 | 73 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **88** | | | | 0.46 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **90** | | | | 0.43 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **100** | | | | 0.39 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 99 | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |