
| RUBEN |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000263532944 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL263532944** | **1999-11-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **670** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-15** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **895** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **953** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1054** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-384** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **323** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.1** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.4** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **10.5** | 0.56 |
| % LAKTOZY | **-0.05** | 0.56 |
| LICZBA CÓREK | **7** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **7** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | - | - |
| wymię | I | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **112** | niski | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **98** | płytki | | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **90** | wąska | | szeroka | 0.79 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **95** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | - | - |
| racice | I | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **96** | iksowate | | równolegle | 0.64 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **113** | luźne | | mocne | 0.78 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **93** | niskie | | wysokie | 0.75 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **103** | słabe | | mocne | 0.71 | - | - |
| położenie wymienia | I | **107** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | I | **90** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **87** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | I | **105** | słaba | | dobra | 0.55 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.43 | 93 | 88 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.32 | 96 | 91 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **102** | | | | 0.50 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **91** | | | | 0.47 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **99** | | | | 0.42 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 55 | < | | | 0.63 | 139 | 130 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |