| NAZWA | |
|---|---|
| **NLDM000265698008**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL265698008**<br>NUMER | **2001-02-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-10** | 0.61 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **830** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **856** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **940** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-953** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **39** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.9** | 0.62 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.3** | 0.61 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.68 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 19 | 16 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 19 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 19 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.69 | 19 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.60 | 19 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.52 | 19 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 19 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.56 | 19 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.50 | 19 | 16 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 19 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 19 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.57 | 19 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.56 | 19 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.53 | 19 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.65 | 19 | 16 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 19 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.68 | 19 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 19 | 16 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 19 | 16 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.57 | 19 | 16 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.38 | 19 | 16 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |