# WILLEM'S-HOEVE WILLEMSHOEVE BO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **NLDM000279792446**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL279792446**<br>NUMER | **2000-09-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **566** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-51** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **707** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **863** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **961** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1301** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-186** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **56** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | 47 | 38 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.56 | 47 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **68** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.54 | 47 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | | | wysoki | 0.78 | 47 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **74** | płytki | < | | | głęboki | 0.66 | 47 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **76** | wąska | < | | | szeroka | 0.63 | 47 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **119** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.71 | 47 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | | | szeroki | 0.70 | 47 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | | | podsiebna | 0.65 | 47 | 38 |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | | | równolegle | 0.52 | 47 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **72** | luźne | < | | | mocne | 0.69 | 47 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | < | | | wysokie | 0.57 | 47 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | | | mocne | 0.63 | 47 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | < | | | wysokie | 0.75 | 47 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | | | wąskie | 0.71 | 47 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | | | długie | 0.77 | 47 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.71 | 47 | 38 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | | | mocna | 0.66 | 45 | 37 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | | | dobra | 0.41 | 25 | 24 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.17 | 13 | 13 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.37 | 253 | 147 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.50 | 73 | 55 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.34 | 253 | 147 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.52 | 73 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |