
# TERENCE
NAZWA

| NLDM000289361737 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL289361737** | **2000-11-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **546** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **10** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **706** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **672** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **901** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1428** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-190** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.2** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.9** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-2.7** | 0.40 |
| % LAKTOZY | **0.07** | 0.40 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **87** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **64** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **64** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **55** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | - | - |
| wymię | I | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | - | - |
| budowa ogólna | I | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **94** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **100** | płytki | | głęboki | 0.72 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **79** | wąska | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | I | **112** | wąski | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | - | - |
| racice | I | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **106** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **80** | luźne | | mocne | 0.78 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **87** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **98** | słabe | | mocne | 0.67 | - | - |
| położenie wymienia | I | **79** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **119** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **77** | krótkie | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **72** | słaba | | mocna | 0.81 | - | - |
| lokomocja | I | **87** | słaba | | dobra | 0.54 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.39 | 92 | 83 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.25 | 92 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **84** | | | | 0.52 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **94** | | | | 0.47 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **91** | | | | 0.44 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 62 | < | | | 0.62 | 114 | 109 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |