
# TABACCO
NAZWA

| NLDM000295614267 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL295614267** | **2001-03-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **560** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-124** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **791** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **821** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **931** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **953** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1515** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-293** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.7** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-25.5** | 0.34 |
| % LAKTOZY | **-0.13** | 0.34 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **85** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **99** | niski | | wysoki | 0.77 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **86** | płytki | | głęboki | 0.65 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **100** | wąska | | szeroka | 0.67 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | - | - |
| szerokość zadu | I | **95** | wąski | | szeroki | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | - | - |
| racice | I | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **96** | iksowate | | równolegle | 0.50 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **84** | luźne | | mocne | 0.70 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | wysokie | 0.60 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **89** | słabe | | mocne | 0.63 | - | - |
| położenie wymienia | I | **87** | niskie | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **69** | szerokie | | wąskie | 0.79 | - | - |
| długość strzyków | I | **109** | krótkie | | długie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **104** | słaba | | mocna | 0.75 | - | - |
| lokomocja | I | **89** | słaba | | dobra | 0.47 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.36 | 34 | 33 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.22 | 44 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **92** | | | | 0.37 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **74** | | | | 0.46 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **100** | | | | 0.33 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 73 | < | | | 0.48 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |