
| KALSER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000376125213**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL376125213**<br>NUMER | **2005-07-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **130** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **829** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1091** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1065** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **189** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **295** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **164** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **136** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **72** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 88 | 68 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 88 | 68 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 88 | 68 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.86 | 88 | 68 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.69 | 88 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.72 | 88 | 68 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 88 | 68 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.78 | 88 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 88 | 68 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 88 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **122** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 88 | 68 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.75 | 88 | 68 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.71 | 88 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.64 | 88 | 68 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.83 | 88 | 68 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 88 | 68 |
| długość strzyków | MACE | **128** | krótkie | | długie | 0.88 | 88 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 88 | 68 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 88 | 68 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.73 | 88 | 68 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.41 | 85 | 65 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.43 | 64 | 51 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.31 | 60 | 46 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.50 | 188 | 133 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.50 | 75 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.42 | 421 | 287 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.62 | 132 | 113 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |