
| LOWLANDS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000424389176** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **NL424389176** NUMER | **2004-12-22** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **682** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **88** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1003** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **832** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **945** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **966** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **195** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **48** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.4** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.8** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **110** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 93 | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 64 | 54 |
| wymię | MACE | 85 | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 64 | 54 |
| budowa ogólna | MACE | 87 | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 64 | 54 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 102 | niski | | wysoki | 0.84 | 64 | 54 |
| głębokość tułowia | MACE | 102 | płytki | | głęboki | 0.67 | 64 | 54 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 113 | wąska | | szeroka | 0.70 | 64 | 54 |
| ustawienie zadu | MACE | 126 | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 64 | 54 |
| szerokość zadu | MACE | 94 | wąski | | szeroki | 0.76 | 64 | 54 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 98 | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 64 | 54 |
| racice | MACE | 92 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 64 | 54 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 105 | iksowate | | równolegle | 0.58 | 64 | 54 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 97 | luźne | | mocne | 0.73 | 64 | 54 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 73 | niskie | | wysokie | 0.69 | 64 | 54 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 82 | słabe | | mocne | 0.62 | 64 | 54 |
| położenie wymienia | MACE | 91 | niskie | | wysokie | 0.81 | 64 | 54 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 102 | szerokie | | wąskie | 0.82 | 64 | 54 |
| długość strzyków | MACE | 80 | krótkie | | długie | 0.85 | 64 | 54 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 96 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 64 | 54 |
| charakter mleczny | MACE | 96 | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 64 | 54 |
| kondycja | MACE | 112 | słaba | | mocna | 0.70 | 64 | 54 |
| lokomocja | MACE | 90 | słaba | | dobra | 0.40 | 64 | 54 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 99 | | | | 0.41 | 56 | 50 |
| temperament | MACE | 112 | | | | 0.30 | 52 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 105 | | | | 0.48 | 105 | 69 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 85 | | | | 0.46 | 56 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 95 | | | | 0.40 | 374 | 246 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 63 | < | | | 0.60 | 105 | 90 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |