
# A-L-H CINZANO
NAZWA

| NLDM000481966866 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL481966866** | **2007-05-21** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **713** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-153** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1078** | 0.77 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1127** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1110** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **970** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-620** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1068** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.9** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.65** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **908** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **402** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 813 | 379 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 813 | 379 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 813 | 379 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.92 | 813 | 379 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.78 | 813 | 379 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.81 | 813 | 379 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 813 | 379 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.86 | 813 | 379 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 813 | 379 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 813 | 379 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 813 | 379 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **126** | luźne | | mocne | 0.78 | 813 | 379 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.80 | 813 | 379 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.70 | 813 | 379 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.89 | 813 | 379 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.91 | 813 | 379 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.93 | 813 | 379 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 813 | 379 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 813 | 379 |
| kondycja | MACE | **76** | słaba | | mocna | 0.79 | 809 | 377 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.45 | 611 | 278 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.36 | 548 | 263 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.11 | 31 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.29 | 94 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | 0.43 | 139 | 88 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |