
# EL AMRA FORMULE 2
NAZWA

| NLDM000511191909 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL511191909** | **1987-01-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **539** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-380** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **871** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1167** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **727** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **924** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2161** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1727** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-28.4** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.56** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-44.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **254** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **203** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **129** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **124** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **51** | niepożądane | | pożądane | 0.34 | 27 | 23 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 85 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 85 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **72** | niski | | wysoki | 0.85 | 85 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.64 | 60 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 85 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | **68** | wąski | | szeroki | 0.75 | 81 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **127** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 85 | 64 |
| racice | MACE | **61** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 58 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.65 | 60 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **68** | słabe | | mocne | 0.58 | 85 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.82 | 85 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 85 | 64 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.87 | 85 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.26 | 61 | 43 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.41 | 219 | 125 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **71** | | | | 0.36 | 73 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.23 | 45 | 24 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.49 | 79 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |