# PEELSEHOEVE
NAZWA

| NLDM000614076848 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL614076848** | **2025-07-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1011** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **585** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1311** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1127** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1169** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1065** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3143** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **800** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **85.8** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.55** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **40.3** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **23** | 0.74 |
| % LAKTOZY | **-0.16** | 0.74 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.58 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **121** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **151** | 0.71 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB | LGBC |
| MFF | POF | POC | SCDC | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **106** | mały | | duży | 0.64 | - | - |
| siła mleczności | G | **108** | niepożądany | | pożądany | 0.66 | - | - |
| nogi-racice | G | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | - | - |
| wymię | G | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | - | - |
| budowa ogólna | G | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.70 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **108** | niski | | wysoki | 0.78 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **77** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **81** | wąska | | szeroka | 0.75 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **116** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | - | - |
| szerokość zadu | G | **100** | wąski | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | G | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **107** | iksowate | | równolegle | 0.68 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **120** | luźne | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **121** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **109** | słabe | | mocne | 0.73 | - | - |
| położenie wymienia | G | **128** | niskie | | wysokie | 0.78 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **93** | wąskie | | szerokie | 0.68 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **108** | szerokie | | wąskie | 0.78 | - | - |
| długość strzyków | G | **110** | krótkie | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | - | - |
| charakter mleczny | G | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | G | **92** | słaba | | mocna | 0.77 | - | - |
| lokomocja | G | **116** | słaba | | dobra | 0.68 | - | - |
| struktura kostna | G | **117** | gruba | | płaska | 0.69 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **107** | | | | 0.56 | - | - |
| temperament | G | **105** | | | | 0.46 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **110** | | | | 0.61 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **107** | | | | 0.63 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **104** | | | | 0.59 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 110 | | | | 0.68 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 95 | | | | 0.42 | - | - |