
| DANITO RF | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000737101287**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL737101287**<br>NUMER | **2012-01-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **695** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **50** | 0.90 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **863** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1148** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-10** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-311** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.7** | 0.91 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.4** | 0.90 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-27** | 0.78 |
| % LAKTOZY | **-0.14** | 0.78 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **105** | mały | | duży | 0.69 | - | - |
| siła mleczności | G | **105** | niepożądany | | pożądany | 0.72 | - | - |
| nogi-racice | GI | **133** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **104** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **112** | płytki | | głęboki | 0.87 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **108** | wąska | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **115** | wąski | | szeroki | 0.88 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | GI | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **123** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **116** | luźne | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **109** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **87** | słabe | | mocne | 0.86 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **106** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **110** | wąskie | | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **107** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **93** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | G | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | GI | **110** | słaba | | mocna | 0.90 | - | - |
| lokomocja | GI | **128** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **106** | gruba | | płaska | 0.76 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **107** | | | | 0.62 | - | - |
| temperament | G | **109** | | | | 0.54 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **104** | | | | 0.72 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **77** | | | | 0.78 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **110** | | | | 0.69 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 61 | < | | | 0.74 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 99 | | | | 0.47 | - | - |