
| BELISAR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000875052876**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL875052876**<br>NUMER | **2014-12-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **819** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **180** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1149** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **939** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1196** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1101** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1223** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **405** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **27.1** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12** | 0.90 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **25.4** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **0.06** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **3** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.70 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **117** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **124** | mały | | duży | 0.68 | - | - |
| siła mleczności | G | **121** | niepożądany | | pożądany | 0.71 | - | - |
| nogi-racice | GI | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **120** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **108** | płytki | | głęboki | 0.87 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **116** | wąska | | szeroka | 0.88 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **134** | wąski | | szeroki | 0.88 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **124** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **117** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **121** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **127** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **101** | słabe | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **122** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **115** | wąskie | | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **113** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **88** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | G | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | GI | **96** | słaba | | mocna | 0.90 | - | - |
| lokomocja | GI | **114** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **107** | słaba | | dobra | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **92** | | | | 0.63 | 2 | 1 |
| temperament | GF | **95** | | | | 0.52 | 2 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **96** | | | | 0.72 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **123** | | | | 0.79 | 1 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **99** | | | | 0.71 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **125** | | > | | 0.81 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **103** | | | | 0.47 | - | - |