# BAGWORTH EDROYS LANA
NAZWA

| NZLM000000098284 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000098284** | **1997-09-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **572** | 0.38 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-151** | 0.43 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **850** | 0.37 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.33 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **950** | 0.41 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **894** | 0.32 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1560** | 0.45 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-407** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.2** | 0.47 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.47 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.4** | 0.40 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.40 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.52 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.45 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.50 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.35 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | 57 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | | | pożądana | 0.37 | 57 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **64** | niski | | | | wysoki | 0.66 | 57 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | | | głęboki | 0.53 | 57 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | | | szeroka | 0.45 | 57 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **74** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.67 | 57 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **72** | wąski | | | | szeroki | 0.58 | 57 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | | | podsiebna | 0.42 | 57 | 36 |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | | | mocne | 0.58 | 57 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | | | wysokie | 0.59 | 57 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | | | mocne | 0.42 | 57 | 36 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | | | wąskie | 0.73 | 57 | 36 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.75 | 57 | 36 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | | | mocna | 0.64 | 57 | 36 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | | | 0.29 | 53 | 33 |
| temperament | MACE | **98** | | | | | | 0.13 | 53 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |