
# BAGWORTH GH L GIFFNOCK-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **NZLM000000102057**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NZ000000102057**<br>NUMER | **2001-08-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.41 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-32** | 0.46 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **994** | 0.41 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1089** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **769** | 0.42 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **952** | 0.33 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-666** | 0.48 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-766** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.7** | 0.50 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.5** | 0.43 |
| % BIAŁKA | **0.21** | 0.43 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.55 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.41 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **48** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 79 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **47** | niepożądana | | pożądana | 0.38 | 79 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **65** | niski | | wysoki | 0.69 | 79 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **79** | płytki | | głęboki | 0.56 | 79 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.47 | 79 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 79 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.61 | 79 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.44 | 79 | 37 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **61** | luźne | | mocne | 0.61 | 79 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **53** | niskie | | wysokie | 0.62 | 79 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **66** | słabe | | mocne | 0.42 | 79 | 37 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **62** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 79 | 37 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 79 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **117** | słaba | | mocna | 0.67 | 82 | 38 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.30 | 72 | 35 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.10 | 72 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |