
# WHAREPOA GB VALENTINO S3F

NAZWA

| | |
|---|---|
| **NZLM000000112058**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NZ000000112058**<br>NUMER | **2011-08-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-13** | 0.45 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1000** | 0.46 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **996** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **785** | 0.36 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **907** | 0.27 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-295** | 0.47 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-703** | 0.54 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2** | 0.50 |
| % TŁUSZCZU | **0.31** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.9** | 0.41 |
| % BIAŁKA | **0.27** | 0.41 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **2842** | 0.54 |
| LICZBA OBÓR | **964** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **64** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 103 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **52** | niepożądana | | pożądana | 0.33 | 103 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **46** | niski | | wysoki | 0.67 | 103 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.53 | 103 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.43 | 103 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **79** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 103 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **65** | wąski | | szeroki | 0.59 | 103 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.39 | 103 | 48 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.59 | 103 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.61 | 103 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.36 | 103 | 48 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **58** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 103 | 48 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **73** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 103 | 48 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.67 | 104 | 48 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.27 | 91 | 43 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.05 | 91 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |