
| CONSI | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM000607110941**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000607110941**<br>NUMER | **1994-09-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-338** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1048** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1057** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **838** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **930** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1330** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-916** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42.9** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-27.8** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-37.5** | 0.88 |
| % LAKTOZY | **0.08** | 0.88 |
| LICZBA CÓREK | **99** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **47** | mały | < | | | duży | 0.83 | 88 | 59 |
| siła mleczności | F | **47** | niepożądany | < | | | pożądany | 0.85 | 88 | 59 |
| nogi-racice | F | **78** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.70 | 88 | 59 |
| wymię | F | **61** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.76 | 88 | 59 |
| budowa ogólna | F | **56** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.80 | 88 | 59 |
| wysokość w krzyżu | F | **63** | niski | < | | | wysoki | 0.91 | 88 | 59 |
| głębokość tułowia | F | **113** | płytki | | | | głęboki | 0.85 | 88 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **118** | wąska | | | | szeroka | 0.84 | 88 | 59 |
| ustawienie zadu | F | **94** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.89 | 88 | 59 |
| szerokość zadu | F | **99** | wąski | | | | szeroki | 0.86 | 88 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **87** | pionowa | | | | podsiebna | 0.73 | 88 | 59 |
| racice | F | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.61 | 88 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.49 | 5 | 5 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **81** | luźne | | | | mocne | 0.83 | 88 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **59** | niskie | < | | | wysokie | 0.83 | 88 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **79** | słabe | < | | | mocne | 0.79 | 88 | 59 |
| położenie wymienia | F | **77** | niskie | < | | | wysokie | 0.90 | 88 | 59 |
| szerokość wymienia | F | **68** | wąskie | < | | | szerokie | 0.82 | 88 | 59 |
| ustawienie strzyków | F | **73** | szerokie | < | | | wąskie | 0.87 | 88 | 59 |
| długość strzyków | F | **112** | krótkie | | | | długie | 0.90 | 88 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **58** | ordynarny | < | | | szlachetny | 0.87 | 88 | 59 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |