# MAC,APEZ MELWOOD GALIFA~O

NAZWA

| | |
|---|---|
| **PRTM00000R802735**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PT00000R802735**<br>NUMER | **1993-04-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-148** | 0.55 |
| PODINDEKS ZDROWIA | - | - |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **852** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-378** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-18.7** | 0.53 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.53 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1259** | 0.60 |
| LICZBA OBÓR | **569** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | - | - |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 811 | 361 |
| wymię | MACE | **61** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 811 | 361 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 811 | 361 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.83 | 811 | 361 |
| głębokość tułowia | MACE | **120** | płytki | | głęboki | 0.76 | 811 | 361 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.73 | 811 | 361 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 811 | 361 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.76 | 811 | 361 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 811 | 361 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 811 | 361 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 735 | 330 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **72** | luźne | | mocne | 0.49 | 811 | 361 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.67 | 811 | 361 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.65 | 811 | 361 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.79 | 811 | 361 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 811 | 361 |
| długość strzyków | MACE | **125** | krótkie | | długie | 0.87 | 811 | 361 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 237 | 117 |
| charakter mleczny | MACE | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 811 | 361 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.37 | 194 | 103 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |