# JAFRAL MARK DRISCOLL-ET

NAZWA

| USAM000002024994 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2024994** | **1986-08-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-117** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **917** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **894** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **788** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-752** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-140** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.4** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.3** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | pożądane | | - | - |
| wymię | I | **80** | niepożądane | | | | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **70** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **76** | niski | | | | wysoki | 0.73 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **99** | płytki | | | | głęboki | 0.62 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **92** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **100** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.68 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | | | szeroki | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **113** | pionowa | | | | podsiebna | 0.63 | - | - |
| racice | I | **63** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.56 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **66** | iksowate | | | | równolegle | 0.48 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **76** | luźne | | | | mocne | 0.63 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **75** | niskie | | | | wysokie | 0.59 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **84** | słabe | | | | mocne | 0.52 | - | - |
| położenie wymienia | I | **75** | niskie | | | | wysokie | 0.71 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **73** | szerokie | | | | wąskie | 0.75 | - | - |
| długość strzyków | I | **119** | krótkie | | | | długie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | **90** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.65 | - | - |
| kondycja | I | **100** | słaba | | | | mocna | 0.65 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |