# BRY-LYN LARAMIE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002093113**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2093113**<br>NUMER | **1988-04-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-278** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **882** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1084** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **872** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1608** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-494** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.4** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.1** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 78 | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | 67 | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | 63 | niepożądana | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 82 | niski | | wysoki | 0.77 | - | - |
| głębokość tułowia | I | 71 | płytki | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | 72 | wąska | | szeroka | 0.70 | - | - |
| ustawienie zadu | I | 99 | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | - | - |
| szerokość zadu | I | 89 | wąski | | szeroki | 0.65 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 115 | pionowa | | podsiebna | 0.68 | - | - |
| racice | I | 75 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | 96 | iksowate | | równolegle | 0.52 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | 69 | luźne | | mocne | 0.67 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | 77 | niskie | | wysokie | 0.63 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 92 | słabe | | mocne | 0.55 | - | - |
| położenie wymienia | I | 80 | niskie | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 86 | szerokie | | wąskie | 0.79 | - | - |
| długość strzyków | I | 94 | krótkie | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | 83 | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | - | - |
| kondycja | I | 83 | słaba | | mocna | 0.68 | - | - |
| lokomocja | I | 84 | słaba | | dobra | 0.56 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |