
# MERIT ZINGSHEIM GEM-ET
NAZWA

| USAM000002172691 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2172691** | **1991-07-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-174** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **932** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **926** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **895** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-832** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-770** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.4** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.8** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | - | - |
| wymię | I | **72** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | **73** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **77** | niski | < | | | wysoki | 0.77 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **93** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **86** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **104** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.72 | - | - |
| szerokość zadu | I | **76** | wąski | < | | | szeroki | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.67 | - | - |
| racice | I | **101** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.53 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **77** | luźne | < | | | mocne | 0.67 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **79** | niskie | < | | | wysokie | 0.63 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **77** | słabe | < | | | mocne | 0.56 | - | - |
| położenie wymienia | I | **76** | niskie | < | | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **73** | szerokie | < | | | wąskie | 0.78 | - | - |
| długość strzyków | I | **117** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | **76** | ordynarny | < | | | szlachetny | 0.68 | - | - |
| kondycja | I | **110** | słaba | | | | mocna | 0.68 | - | - |
| lokomocja | I | **92** | słaba | | | | dobra | 0.57 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |