
# SHEY-LAND MAGNUM-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002178476**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2178476**<br>NUMER | **1991-11-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-184** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **915** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-850** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-714** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.6** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.7** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **31** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 27 | 25 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 27 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 27 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.77 | 27 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.58 | 27 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.55 | 27 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 27 | 25 |
| szerokość zadu | - | **-** | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 27 | 25 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 27 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 26 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.58 | 27 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.60 | 27 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.51 | 27 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.75 | 27 | 25 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 27 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.77 | 27 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 27 | 25 |
| kondycja | - | **-** | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |