# PINEHURST BLACKCHIEF-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002208099**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2208099**<br>NUMER | **1993-01-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | **-** |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-307** | 0.54 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **953** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1048** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **-** | - |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-** | **-** |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-720** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.9** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.2** | 0.51 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.51 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **222** | 0.59 |
| LICZBA OBÓR | **38** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.63 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | - | - | niski | | wysoki | | - | - |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | - | - | uniesiony | | spadzisty | | - | - |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | - | - | pionowa | | podsiebna | | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | - | - | słabe | | mocne | | - | - |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | - | - | szerokie | | wąskie | | - | - |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |