
# EXRANCO BELLWETHER
NAZWA

| USAM000017173631 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US17173631** | **1996-10-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-72** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1014** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **877** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-150** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **72** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.1** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 75 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| wymię | I | 83 | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | 85 | niepożądana | | pożądana | 0.58 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 92 | niski | | wysoki | 0.79 | - | - |
| głębokość tułowia | I | 102 | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | 92 | wąska | | szeroka | 0.72 | - | - |
| ustawienie zadu | I | 111 | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | - | - |
| szerokość zadu | I | 85 | wąski | | szeroki | 0.67 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 101 | pionowa | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | 88 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | 75 | iksowate | | równolegle | 0.54 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | 81 | luźne | | mocne | 0.69 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | 89 | niskie | | wysokie | 0.64 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 92 | słabe | | mocne | 0.57 | - | - |
| położenie wymienia | I | 77 | niskie | | wysokie | 0.78 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 83 | szerokie | | wąskie | 0.81 | - | - |
| długość strzyków | I | 115 | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | 92 | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | - | - |
| kondycja | I | 95 | słaba | | mocna | 0.69 | - | - |
| lokomocja | I | 70 | słaba | | dobra | 0.59 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 103 | | | | 0.38 | 120 | 42 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |