
# SANDY-VALLEY CHICAGO-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017246344**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17246344**<br>NUMER | **1997-02-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-131** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **963** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **827** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **940** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-434** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-91** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **93** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **49** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 67 | 53 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 67 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 67 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **60** | niski | | wysoki | 0.81 | 67 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.68 | 67 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **75** | wąska | | szeroka | 0.72 | 67 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 67 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.70 | 67 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **134** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 67 | 53 |
| racice | MACE | **62** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 67 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **60** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 67 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.69 | 67 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.67 | 67 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.60 | 67 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.79 | 67 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 67 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.79 | 67 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **84** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 67 | 53 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.62 | 67 | 53 |
| lokomocja | MACE | **60** | słaba | | dobra | 0.54 | 67 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.43 | 219 | 125 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.45 | 54 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.37 | 103 | 49 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |