
# ROCK-WILLS PATRON DAKOTA-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017306440**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17306440**<br>NUMER | **1997-03-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-61** | 0.59 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **892** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **929** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1017** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-466** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **220** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.3** | 0.60 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2** | 0.58 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **24** | 0.62 |
| LICZBA OBÓR | **21** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | | | pożądane | 0.47 | 21 | 19 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | | | pożądane | 0.49 | 21 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | | | pożądana | 0.52 | 21 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | | | wysoki | 0.68 | 21 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | | | głęboki | 0.56 | 21 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | | | szeroka | 0.58 | 21 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.63 | 21 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | | | szeroki | 0.56 | 21 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | | | podsiebna | 0.55 | 21 | 19 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.47 | 21 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | | | równolegle | 0.44 | 21 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | | | mocne | 0.54 | 21 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | | | wysokie | 0.52 | 21 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | | | mocne | 0.46 | 21 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | | | wysokie | 0.63 | 21 | 19 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | | | wąskie | 0.60 | 21 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | | | długie | 0.63 | 21 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.48 | 21 | 19 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | | | mocna | 0.50 | 21 | 19 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | | | dobra | 0.43 | 21 | 19 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |