
# CHEL-BROOK FORM DUCAN-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000018011807**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US18011807**<br>NUMER | **1997-08-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **606** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-135** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **965** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **825** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **983** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-606** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **91** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.1** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **39** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **31** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 30 | 24 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 30 | 24 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 30 | 24 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.77 | 30 | 24 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.60 | 30 | 24 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **116** | wąska | | szeroka | 0.57 | 30 | 24 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 30 | 24 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 30 | 24 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 30 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 30 | 24 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.59 | 30 | 24 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.61 | 30 | 24 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.52 | 30 | 24 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.75 | 30 | 24 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 30 | 24 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.77 | 30 | 24 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 30 | 24 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.33 | 43 | 21 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.43 | 50 | 23 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |