
# LEXVOLD WEBSTER CULLEN-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000051564344**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US51564344**<br>NUMER | **2001-10-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **610** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-61** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **824** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **891** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **959** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1001** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1339** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-104** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.1** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **63** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 54 | 47 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 54 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 54 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.83 | 54 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.66 | 54 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.64 | 54 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 54 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.79 | 54 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 54 | 47 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 54 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 54 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.67 | 54 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.68 | 54 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.58 | 54 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.82 | 54 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 54 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.84 | 54 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 54 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 54 | 47 |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.64 | 32 | 26 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.36 | 101 | 79 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.38 | 125 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.33 | 115 | 87 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.50 | 136 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |