
# AMSTERDAM DAYTONA-ET
NAZWA

| USAM000055385895 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US55385895** | **2009-04-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **737** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-87** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1088** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1082** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1142** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **175** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **72** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4.5** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 39 | 26 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 39 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 39 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.75 | 39 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.62 | 39 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.65 | 39 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 39 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.63 | 39 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 39 | 26 |
| racice | MACE | **119** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 39 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 39 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.61 | 39 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.59 | 39 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.52 | 39 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.72 | 39 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 39 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **118** | krótkie | | długie | 0.72 | 39 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 39 | 26 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 39 | 26 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.56 | 39 | 26 |
| lokomocja | MACE | **118** | słaba | | dobra | 0.49 | 39 | 26 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.43 | 169 | 75 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.42 | 58 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.38 | 159 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.46 | 55 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |