
# ART-ACRES HI PETE 779

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060654936**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60654936**<br>NUMER | **2002-06-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **604** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-88** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **924** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **796** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **973** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **947** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-474** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **5** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | | | pożądane | 0.52 | 52 | 36 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | 52 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | 51 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **76** | niski | < | | | wysoki | 0.78 | 52 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | | | głęboki | 0.63 | 52 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | | | szeroka | 0.67 | 52 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **73** | uniesiony | < | | | spadzisty | 0.73 | 52 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | | | szeroki | 0.65 | 52 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | | | podsiebna | 0.67 | 52 | 36 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.57 | 52 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | | | równolegle | 0.51 | 52 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | | | mocne | 0.63 | 52 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | | | wysokie | 0.61 | 52 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | | | mocne | 0.53 | 52 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.75 | 52 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | | | wąskie | 0.72 | 52 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | | | długie | 0.75 | 52 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.68 | 52 | 36 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 52 | 36 |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | | | mocna | 0.57 | 52 | 36 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | | | dobra | 0.47 | 52 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.36 | 210 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.39 | 73 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.28 | 91 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |