
# HASS-ACRES BAYMONT-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000062169070**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US62169070**<br>NUMER | **2008-07-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **656** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-104** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **955** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **904** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1081** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1052** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-593** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-234** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **119** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 30 | 20 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 30 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 30 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.74 | 30 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.61 | 30 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.64 | 30 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 30 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.62 | 30 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 30 | 20 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 30 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 30 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.60 | 30 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.58 | 30 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.52 | 30 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.70 | 30 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 30 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.70 | 30 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 30 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 30 | 20 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.56 | 30 | 20 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.48 | 30 | 20 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.45 | 198 | 79 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.47 | 83 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.41 | 189 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.49 | 67 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |