
# PEPST BOLIVER HAMDEN-ET
NAZWA

| USAM000064865374 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US64865374** | **2008-11-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **638** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-171** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **928** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **957** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1070** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1057** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-921** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-186** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **140** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 44 | 37 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 44 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 43 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.77 | 44 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.63 | 44 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.67 | 44 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **83** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 44 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.65 | 44 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **126** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 44 | 37 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 44 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 44 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **127** | luźne | | mocne | 0.63 | 44 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.61 | 44 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **136** | słabe | | mocne | 0.54 | 44 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.74 | 44 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **123** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 44 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.74 | 44 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 44 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 44 | 37 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.57 | 44 | 37 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.50 | 44 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.44 | 254 | 110 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.46 | 99 | 65 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.39 | 198 | 87 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.49 | 78 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |