
# CEDAR-HAVEN PLURAL-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000065997323**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US65997323**<br>NUMER | **2009-01-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **674** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **966** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **835** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1030** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-163** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **496** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.7** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **90** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 75 | 57 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 75 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 75 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.83 | 75 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.66 | 75 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.66 | 75 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 75 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | szeroki | 0.77 | 75 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **129** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 75 | 57 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 75 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 75 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.71 | 75 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.55 | 75 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.66 | 75 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.82 | 75 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 75 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.75 | 75 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 75 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 75 | 57 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.70 | 75 | 57 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.46 | 75 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.43 | 78 | 62 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.34 | 78 | 62 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.45 | 248 | 141 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.52 | 69 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.38 | 248 | 141 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.55 | 69 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |