
# MONUMENT RUSSELL BLAKE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000070098615**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US70098615**<br>NUMER | **2010-10-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **761** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-4** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1054** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1159** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1077** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1057** | 0.35 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **220** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-244** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **102** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **119** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **119** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **116** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 20 | 16 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 20 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 20 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.67 | 20 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.53 | 20 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.56 | 20 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 20 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.52 | 20 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 20 | 16 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 20 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.39 | 20 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **117** | luźne | | mocne | 0.51 | 20 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.48 | 20 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.41 | 20 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.62 | 20 | 16 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.58 | 20 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.61 | 20 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.53 | 20 | 16 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 20 | 16 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.47 | 20 | 16 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.37 | 20 | 16 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.35 | 222 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.38 | 70 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.29 | 201 | 72 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.43 | 67 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |