
# MERRY CASEY LEIF LOUIE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000122117709**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US122117709**<br>NUMER | **1998-02-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **624** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-133** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **890** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **982** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **964** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1010** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-286** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **91** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | 56 | 47 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | 56 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | | | pożądana | 0.57 | 54 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | | | wysoki | 0.79 | 56 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | 56 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | 56 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.74 | 56 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | | | szeroki | 0.66 | 56 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | | | podsiebna | 0.69 | 56 | 47 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.59 | 56 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | | | równolegle | 0.52 | 56 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | | | mocne | 0.65 | 56 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | | | wysokie | 0.62 | 56 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | | | mocne | 0.53 | 56 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | | | wysokie | 0.76 | 56 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | | | wąskie | 0.73 | 56 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | | | długie | 0.76 | 56 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.59 | 24 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 56 | 47 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | | | mocna | 0.57 | 56 | 47 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | | | dobra | 0.48 | 56 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.35 | 174 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.37 | 54 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.25 | 71 | 41 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |