
# SIR CHEROKEE MIAMI-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000125755445**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US125755445**<br>NUMER | **1998-10-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **612** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **890** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **901** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **879** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1005** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-839** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-220** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.3** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **65** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 65 | 53 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 65 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 65 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.83 | 65 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.67 | 65 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.67 | 65 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 65 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.77 | 65 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **132** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 65 | 53 |
| racice | MACE | **77** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 65 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **61** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 65 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.71 | 65 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.57 | 65 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.66 | 65 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.82 | 65 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 65 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.76 | 65 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 65 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 65 | 53 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **67** | słaba | | dobra | 0.44 | 65 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.34 | 67 | 52 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.20 | 67 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.38 | 155 | 89 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.30 | 145 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |