
# HUMDINGER EMERSON PISTOL-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000130486286**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US130486286**<br>NUMER | **2000-10-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **627** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **57** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **862** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **751** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **968** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **991** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-783** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **313** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **112** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **69** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 77 | 51 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 77 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 77 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.81 | 77 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.66 | 77 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.71 | 77 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 77 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.69 | 77 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 77 | 51 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 77 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 77 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.67 | 77 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.66 | 77 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.57 | 77 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.79 | 77 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 77 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.80 | 77 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 77 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 77 | 51 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.59 | 77 | 51 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | dobra | 0.52 | 77 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.40 | 221 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.42 | 70 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | < | | | 0.30 | 58 | 22 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.44 | 52 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |