
# WHITTIER-FARMS KEATS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000130548234**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US130548234**<br>NUMER | **2000-10-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **902** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **841** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **944** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-292** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **211** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **119** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 68 | 39 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 68 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 68 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.79 | 68 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.65 | 68 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.70 | 68 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 68 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.67 | 68 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 68 | 39 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 68 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 68 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.66 | 68 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.64 | 68 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.56 | 68 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.77 | 68 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **121** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 68 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.77 | 68 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 68 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **78** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 68 | 39 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.59 | 68 | 39 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.52 | 68 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.43 | 236 | 68 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.46 | 98 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **121** | | | | 0.36 | 106 | 35 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.47 | 70 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |