
# KEYKOW SPOTLITE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000132682268**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US132682268**<br>NUMER | **2002-03-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **573** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-178** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **839** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **813** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1006** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.35 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-930** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **305** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.2** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.2** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.26** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.64 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 38 | 34 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 38 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 38 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.75 | 38 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **123** | płytki | | głęboki | 0.61 | 38 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.65 | 38 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 38 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.62 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 38 | 34 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 38 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.60 | 38 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.58 | 38 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.50 | 38 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.72 | 38 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 38 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.72 | 38 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 38 | 34 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 38 | 34 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.54 | 38 | 34 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.45 | 38 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.35 | 139 | 80 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.27 | 87 | 50 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |