
# ZIMMERVIEW FORD SKYLER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000132791647**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US132791647**<br>NUMER | **2002-02-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **694** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **85** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **947** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **832** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1063** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **301** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **206** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **112** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 108 | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 14 | 13 |
| wymię | MACE | 99 | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 14 | 13 |
| budowa ogólna | MACE | 111 | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 13 | 12 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 113 | niski | | wysoki | 0.65 | 14 | 13 |
| głębokość tułowia | MACE | 116 | płytki | | głęboki | 0.54 | 14 | 13 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 105 | wąska | | szeroka | 0.56 | 14 | 13 |
| ustawienie zadu | MACE | 101 | uniesiony | | spadzisty | 0.60 | 14 | 13 |
| szerokość zadu | MACE | 111 | wąski | | szeroki | 0.54 | 14 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 111 | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 14 | 13 |
| racice | MACE | 110 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 14 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 101 | iksowate | | równolegle | 0.43 | 14 | 13 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 105 | luźne | | mocne | 0.52 | 14 | 13 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 102 | niskie | | wysokie | 0.50 | 14 | 13 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 112 | słabe | | mocne | 0.46 | 14 | 13 |
| położenie wymienia | MACE | 106 | niskie | | wysokie | 0.61 | 14 | 13 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 104 | szerokie | | wąskie | 0.58 | 14 | 13 |
| długość strzyków | MACE | 123 | krótkie | | długie | 0.60 | 14 | 13 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 107 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.54 | 14 | 13 |
| charakter mleczny | MACE | 111 | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 14 | 13 |
| kondycja | MACE | 85 | słaba | | mocna | 0.50 | 14 | 13 |
| lokomocja | MACE | 103 | słaba | | dobra | 0.41 | 14 | 13 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 85 | | | | 0.40 | 186 | 64 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 101 | | | | 0.44 | 81 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |