
| ERNESTO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000133759547**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US133759547**<br>NUMER | **2002-11-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **674** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-9** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **970** | 0.87 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **850** | 0.83 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1055** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-544** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-305** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.4** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.4** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-14.5** | 0.84 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.84 |
| LICZBA CÓREK | **15** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **9** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.75 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.83 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **105** | mały | | duży | 0.67 | - | - |
| siła mleczności | G | **101** | niepożądany | | pożądany | 0.69 | - | - |
| nogi-racice | G | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | - | - |
| wymię | G | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | - | - |
| budowa ogólna | G | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.77 | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.93 | 1895 | 488 |
| głębokość tułowia | G | **108** | płytki | | głęboki | 0.81 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **119** | wąska | | szeroka | 0.88 | 1895 | 488 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 1895 | 488 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.88 | 1895 | 488 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.92 | 1895 | 488 |
| racice | G | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **110** | iksowate | | równolegle | 0.76 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.87 | 1895 | 488 |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **93** | niskie | | wysokie | 0.79 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **129** | słabe | | mocne | 0.86 | 1895 | 488 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.92 | 1895 | 488 |
| szerokość wymienia | G | **104** | wąskie | | szerokie | 0.74 | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **142** | szerokie | | wąskie | 0.93 | 1895 | 488 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.96 | 1895 | 488 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **139** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | 1895 | 488 |
| charakter mleczny | G | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.81 | - | - |
| kondycja | G | **105** | słaba | | mocna | 0.83 | - | - |
| lokomocja | G | **105** | słaba | | dobra | 0.76 | - | - |
| struktura kostna | G | **93** | gruba | | płaska | 0.74 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **92** | | | | 0.67 | 14 | 7 |
| temperament | GF | **114** | | | | 0.57 | 11 | 5 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **103** | | | | 0.72 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **108** | | | | 0.78 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **107** | | | | 0.69 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | 108 | | | | 0.82 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 106 | | | | 0.43 | - | - |