
# KLEINSVIEW MAGNA CARTA-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000133938894**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US133938894**<br>NUMER | **2003-01-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-217** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **869** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **978** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1016** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1261** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-288** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 40 | 33 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 40 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 40 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.76 | 40 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.63 | 40 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.66 | 40 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 40 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.64 | 40 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 40 | 33 |
| racice | MACE | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 40 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 40 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.62 | 40 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.60 | 40 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.53 | 40 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.73 | 40 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 40 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.73 | 40 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 40 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 40 | 33 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.57 | 40 | 33 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.47 | 40 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.38 | 205 | 94 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.42 | 59 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.29 | 58 | 21 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.45 | 50 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |