
# KLEINSVIEW MAGNA CULVER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000134839509**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US134839509**<br>NUMER | **2003-11-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-34** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **930** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **861** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1030** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1001** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-306** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **141** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 56 | 34 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 56 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 56 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.81 | 56 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.70 | 56 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.67 | 56 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 56 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.73 | 56 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 56 | 34 |
| racice | MACE | **124** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.50 | 54 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 56 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.73 | 56 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.62 | 56 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.68 | 56 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.78 | 56 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 56 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.81 | 56 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **123** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.76 | 56 | 34 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.70 | 54 | 33 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.43 | 54 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.34 | 36 | 22 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 203 | 63 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.52 | 67 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.35 | 203 | 63 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.54 | 67 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |